

JP157 トカラ列島（とかられっとう）

鹿児島県：十島村

位置	N 29° 51′ E 129° 52′
面積	8,400ha

環境構成【島嶼／森林】

トカラ列島は屋久島と奄美大島の間の海上に飛石状に並んでいる霧島火山帯に属する火山列島である。口之島を最北の島として中之島、臥蛇島、小臥蛇島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、子宝島、宝島、上ノ根島、横当島の大小 10 余りの島々である。中之島の面積は 27.5 km² 標高は 979m である。小宝島石灰岩よりなる台地、段丘で、宝島は中央部を取り囲む形で石灰岩がある。他の島は火山地で占められ、海岸から急斜面になっている。臥蛇、小臥蛇、横当、上ノ根島は無人島である。山地はスタジイやタブノキ、ビロウなどの森林とリュウキュウチクの群落で覆われている。低地はアコウやガジュマル等亜熱帯の植物群落も見られる。

選定理由

A1	アカコッコ・イイジマムシクイ
A2	カラスバト・ズアカアオバト・アカヒゲ・アカコッコ・イイジマムシクイ

保護指定

サイトの全域（90%以上）に法的な担保がある

<保護指定の内容>

都道府県立自然公園（トカラ列島県立自然公園）、自然環境保全地域

保全への脅威

- ・リュウキュウチク林への移行
- ・野生化したヤギの食害による植生の変遷
- ・外来種の侵入による生態系への影響
 - クジャク（諏訪之瀬島）、キジ（中之島・諏訪之瀬島）、ホンドリタチ（口之島・悪石島）、ヒメアマガエル（諏訪之瀬島）など
- ・クマネズミ（口之島・諏訪之瀬島・宝島）、ドブネズミ（宝島）の鳥類の捕食
- ・飼い猫による捕食
- ・ハシブトガラス（繁殖）やトビ（平島繁殖）の個体数の増加

保全活動

なし

見られる鳥

1970 年以降に調査が始まり 214 種以上の鳥の記録がある。特徴的なアカヒゲ、アカコッコ、イイジマムシクイなどの鳥が繁殖している。春と秋には離島なので様々な鳥が渡りの中継地として利用している。

留鳥	カツオドリ、オオミズナギドリ、クロサギ、ミサゴ、トビ、カラスバト、ズアカアオバト、キジバト、バン、カワセミ、サンショウクイ、ヒヨドリ、イソヒヨドリ、カワラヒワ、ヤマガラ、メジロ、ハシブトガラス、リュウキュウキビタキ
夏鳥	アカヒゲ、アカコッコ、イイジマムシクイ、ホトギス、アカショウビン
冬鳥	ウミウ、オシドリ、オオタカ、ノスリ、ヤマシギ、ビンズイ、タヒバリ、ジョウビタキ、ツグミ、ミヤマホオジロ、アオジ、アリスイ
旅鳥	サンカノゴイ、ミゾゴイ、カラシラサギ、コチドリ、メダイチドリ、ウズラシギ、キアシシギ、ツバメチドリ、カラアカハラ
迷鳥	カンムリカッコウ、ハマヒバリ、ミヤマヒタキ、コウライウグイス

関連団体・自治体・施設等

・日本野鳥の会かごしま県支部

N



口之島
Kuchino-shima Is.

十島村
Toshima-Mura

吐か喇列島
Tokara-retto Is.
東シナ海
East China Sea

十島村
Toshima-Mura

中之島
Nakanoshima Is.

平島
Taira Is.

諏訪之瀬島
Suwayanose-jima Is.

悪石島
Akushi Is.

小島
Kojima Is.

宝島
Takajima Is.

上ノ根島
Kaminone-jima Is.

横出島
Yokodate-jima Is.



Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community